

Aliment complémentaire de fourrages

Chevaux et poneys adultes

Composition adaptée aux chevaux et poneys d'instruction et de sport.

- ▶ Activité modérée à soutenue.
- ▶ Chevaux et poneys avec influx et en état.

Apports nutritionnels

IDN
INDEX DESTRIER NUTRITION


Bénéfices nutritionnels

Concentration et efficacité alimentaire



UFC = 0,85
Concentration optimum en micronutriments
Oligo-éléments protégés (chélates)

Sécurité digestive



Energie à dominante glucidique

Intégrité musculo squelettique et récupération



Energie à dominante glucidique
Ratio oméga 6 / oméga 3 maîtrisé
Oligo-éléments protégés (chélates)
Concentration sécurisée d'antioxydants : vitamines et sélénium
Enrichi en complexe naturel antioxydant Triplox
BACA positive


Santé et résistance au stress



Concentration optimum en micronutriments
Ratio oméga 6 / oméga 3 maîtrisé
Oligo-éléments protégés (chélates)
Concentration sécurisée d'antioxydants : vitamines et sélénium
Enrichi en complexe naturel antioxydant Triplox

IDE
INDICE DESTRIER ENERGIE

Répartition des sources d'énergie



Mode d'emploi

Pour définir le meilleur rationnement consultez votre conseiller Destrier, équipé de Destrier ONE.

		POIDS DU CHEVAL				
		200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg
1 mesure Destrier = 2 L						
ALIMENT	L / jour *	2 à 5	3 à 7	4 à 10	5 à 12	6 à 14
	<i>Nombre de repas minimum / jour</i>	> 2 L : 2 > 4 L : 3	> 3 L : 2 > 6 L : 3	> 4 L : 2 > 8 L : 3	> 5 L : 2 > 10 L : 3	> 6 L : 2 > 12 L : 3
FOIN	Sur litière de paille (kg/jour minimum)	2	3	4	5	6
	Sur litière inerte (kg/jour minimum)	3	4,5	6	7,5	9

* Selon le travail demandé, l'état du cheval, la quantité et la qualité nutritionnelle des fourrages.

OPEN FLOC contient des céréales en quantité adaptée aux besoins et aux capacités digestives du cheval. Pour conserver une ration équilibrée et un cheval en bonne santé, il n'est donc pas conseillé de rajouter ou de substituer une partie de l'aliment avec de l'orge ou de l'avoine.

Et pour les autres chevaux et poneys

Aliment

Recommandations : de 0,5 à 1,2 kg par 100 kg de poids vif par jour.

Fractionnement des repas : la quantité en kg distribuée par repas ne doit pas dépasser 0,5 % du poids du cheval.

Conversion entre kg et litres : Densité moyenne du produit : 1 L = 500 g / 1 kg = 2 L.

Fourrage

▶ **Sur litière de paille :** minimum 1 kg de foin par 100 kg de poids vif.

▶ **Sur litière inerte :** minimum 1,5 kg de foin par 100 kg de poids vif.

Aliment complémentaire de fourrages

Chevaux et poneys adultes

La liste exhaustive des ingrédients est indiquée sur l'étiquette du produit. Les matières premières incorporées y sont listées par ordre décroissant de taux d'incorporation.

		ALIMENTS COMPLEMENTAIRES DE FOURRAGES
		Chevaux au travail
		Open Floc
Teneurs moyennes (par kg de produit brut)	UFC	0,85
	MADC (g)	96
	Calcium (g)	8
	Phosphore (g)	5
	Amidon (%)	28
Constituants analytiques (par kg de produit brut)	Protéine brute (%)	12
	Matières grasses brutes (%)	2,5
	Omega 3 (g)	1,5
	Cellulose brute (%)	11
	Matières minérales Cendres brutes (%)	7
Vitamines (par kg de produit brut)	Vitamine A (UI)	8 400
	Vitamine D3 (UI)	1 344
	Vitamine B1 (mg)	4
	Vitamine E (mg)	55
	Vitamine E Naturelle/ Triplex (mg)	55
Oligos-éléments (par kg de produit brut)	Fer (mg)	201
	Fer chélaté	*
	Zinc (mg)	115
	Zinc chélaté	*
	Manganèse (mg)	103
	Manganèse chélaté	*
	Cuivre (mg)	32
	Cuivre chélaté	*
	Sélénium (mg)	0,25
	dont Sélénium organique (mg)	0,08